

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Ministère de l'Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
Chemin d'Artigues - 33150 CENON

Aquitaine

Dordogne-Gironde-Landes-Lot&Garonne-Pyrénées Atlantiques

Abonnement annuel : 100,00 F



(56) 86.22.75

BULLETIN TECHNIQUE N° 25 - MARDI 12 JUILLET 1983

VITICULTURE

POURRITURE GRISE

De nombreuses parcelles atteignent maintenant le stade "fermeture de la grappe" aussi il convient de raisonner l'opportunité du traitement anti-botrytis spécifique prévu à ce stade par la méthode standard.

Nous rappelons (voir note diffusée dans le bulletin n° 20 du 3 juin dernier) qu'il est prudent de ne pas dépasser deux applications annuelles de spécialités à base d'imides cycliques afin de limiter l'apparition ou le développement de souches résistantes à ces produits.

Les risques "Botrytis" restent limités et leur évolution est en général peu importante et même, dans certains secteurs, en diminution depuis la fin de la floraison. Ces risques sont appréciés par la modélisation de la maladie dont les calculs sont effectués à partir des relevés de postes météorologiques répartis sur l'ensemble des vignobles de la circonscription.

Cependant on enregistre des variations en fonction de l'importance des précipitations et de la durée des périodes d'humectation au cours de la période orageuse de la semaine dernière.

Ainsi, ces phénomènes très locaux ne nous permettent pas de dégager un avis généralisé. En revanche chaque viticulteur décidera de l'opportunité d'une intervention en fonction des éléments suivants, si le stade "fermeture de la grappe" est atteint :

- Si les précipitations ont été faibles ou nulles :
Aucune intervention n'est à envisager.

- Si les précipitations ont été importantes et si elles sont étalées sur plusieurs jours, notamment en cours de journée :

Une intervention est à réaliser, principalement sur les cépages sensibles à la maladie (Sémillon, Sauvignon) ou très sensibles (Muscadelle). La spécialité commerciale (Kidan, Ronilan, Ronilan SP, Rovral ou Sumisclex) sera alors appliquée à volume réduit, en traitant au niveau des grappes sur les 2 faces de chaque rang.

Pour les zones plus tardives, des indications seront fournies dans un prochain bulletin. Notons qu'actuellement le risque le plus élevé de la circonscription est noté dans le vignoble de Jurançon.

.../...

P 540

EUDEMIS - COCHYLIS

Le vol se poursuit très activement dans l'ensemble des secteurs sauf dans le Nord Blayais, à proximité des Charentes où il débute seulement. Dans ce secteur uniquement, contrairement à notre bulletin précédent, il n'y a pas lieu d'intervenir et le traitement pourra être encore retardé. Attendre un prochain avis.

Ailleurs, les éclosions sont en cours et les premières pénétrations sont observées. Le traitement, conseillé dans notre précédent bulletin, permettra d'assurer une lutte préventive contre ces parasites.

ARBORICULTURETORDEUSE DE LA PELURE (Capua)

Le 2° vol a maintenant débuté mais les captures sont encore faibles. Il est trop tôt pour intervenir.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le 2° vol vient juste de débiter dans les secteurs les plus précoces. Il est trop tôt pour intervenir. Attendre un prochain bulletin.

ACARIENS

On observe encore localement des populations importantes. Dans le cas où des traitements ont déjà été effectués et s'il est encore nécessaire d'intervenir il est vivement conseillé de changer de famille chimique, dans le choix de l'acaricide.

PUCERON VERT DU POMMIER

La présence de ce puceron (Aphis pomi) est décelée dans de nombreux vergers. Le seuil d'intervention est d'au moins 15 pousses infectées sur 100 observées et les cas d'intervention spécifique restent assez rares.

GRANDES CULTURESTOURNESOL

Les nécroses internervaires et grillures du feuillage observées après de fortes pluies, en terrain profond, sont imputables à une carence en bore (pas de traitement connu).

CEREALESPRESERVATION DE LA RECOLTE

C'est la suite logique des efforts réalisés en culture. Elle consiste au nettoyage soigné et au traitement insecticide au pulvérisateur de toute la chaîne de récolte (moissonneuse batteuse, remorques, cellules ; locaux de stockage). Produits homologués :

- bromophos
- dichlorvos
- iodofenphos
- malathion
- pirimiphos méthyl

0000000